

# Agrosvet




specijalno izdanje

Agromarket preporučuje



BESPLATAN PRIMERAK



#### DISTRIBUTIVNI CENTRI:

**Kragujevac** 034/300-435,  
**Beograd** 011/84-88-307,  
**Valjevo** 014/286-800,  
**Subotica** 024/753-307,  
**Sombor** 025/432-410,  
**S.Mitrovica** 022/649-013,  
**Niš** 018/274-700

Crna Gora-Agromarket CG  
 Podgorica +382/81 872-165

#### STRUČNA SLUŽBA:

##### // Marketing

**Jotov Aleksandar**, šef stručne službe,  
 teren Vojvodine, 063/658-310  
**Goran Petrović**, jugoistočna Srbija  
 063/10-58-320  
**Đorđević Dragan**, teren istočne Srbije  
 063/10-22-345  
**Vučković Radmila**, teren centralne Srbije  
 063/10-58-194  
**Dušan Savić**, ishrana bilja, teren Srbije  
 063/10-60-742

##### // Prodaja


**Dragutinović Vladimir**, teren centralne Srbije  
 063/438-483  
**Šuljagić Veselin**, teren zapadne Srbije  
 063/658-307  
**Radovanović Zoran**, teren centralne Srbije  
 063/10-58-091  
**Neša Milojević**, teren centralne Srbije  
 063/10-58-278  
**Tomašev Miloš**, deo severne i srednje Bačke,  
 sever Banata 063/635-495  
**Hristov Velibor**, južni Banat  
 063/658-312  
**Lugonja Nebojša**, deo Bačke i deo Banata  
 063/10-58-223  
**Mitrović Dragoslav**, donji Srem i okolina Beograda  
 063/10-58-191  
**Gnjatović Ivan**, srednji Banat  
 063/11-24-540  
**Đokić Bojan**, jug Srbije  
 063/668-165  
**Dolinaj Darko**, Srem, Novi Sad i Mačva  
 063/11-23-309  
**Klisurić Dejan**, Srem, Novi Sad i Mačva,  
 063/11-24-570

**Nada Jovanović**, zapadna i južna Bačka  
 063/693-501  
**Grnja Danijel**, deo zapadne i  
 južne Bačke, 063/438-641  
**Arsenijević Dragutin**, zapadna Srbija i  
 Mačva, 063/657-929

**Miroslav Jokić**, Crna Gora  
 069/300-845



# Jabuka

faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Bubrenje pupoljaka	 Čađava krastavost Jaja štetočina	Cuprablau Z (0,5%) ili Funguran OH (0,4-0,5%) + Galmin (2-3%)
Zeleni buketiči	 Čađava krastavost	Pyrus 400 SC (0,1%) + Dithane M-45 (0,2%) + Karathane EC (0,075%) + Nurelle-D (0,1%)
Roze pupoljak	 Čađava krastavost	Pyrus 400 SC (0,1%) + Dithane DG Neo TEC (0,25%) + Karathane EC (0,05%) + Vantex 60CS (60 ml/ha)
Cvetanje	 Čađava krastavost Pepelnica jabuke	Pyrus 400 SC (0,075-0,1%) + Stroby DF (0,2kg/ha)
Precvetavanje	 Čađava krastavost Pepelnica jabuke Lisne vaši Mineri	Score 250EC (200ml/ha) + Captan 80WG (0,2%) + Microthiol disperss (0,3%) + Actara 25WG (200g/ha) ili Afinex 20SP (0,025%)
Plod veličine lešnika	 Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac	Score 250EC (200 ml/ha) + Delan 700 WG (0,05%) + Insegar 25 WG (600 g/ha) + Vantex 60CS (60 ml/ha)
Plod veličine oraha	 Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac	Indar 5 EW (0,09%) + Captan 80 WG (0,2%) + Nurelle D (0,1%)
7 do 10 dana kasnije	 Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac Lisne vaši	Delan 700 WG (0,05%) + Systhane 12 E (0,035%) + Afinex 20 SP (0,025%)
Rast plodova	 Čađava krastavost Pepelnica Miner, smotavac	Tercel (0,25%) + Match 050EC (0,1%)
10 – 12 dana kasnije	 Čađava krastavost Pepelnica jabuke Jabukin smotavac	Captan 50 WP (0,25%) + Topas 100EC (0,025%) + Nurelle-D (0,15%)
10 - 12 dana kasnije	 Čađava krastavost Jabukin smotavac	Agrobin 60WP (0,1%) + Insegar 25 WG (600 g/ha)
10-14 dana kasnije	 Čađava krastavost Pepelnica Jabukin smotavac	Flint plus (1,85 kg/ha) +  Vantex 60CS (60ml/ha)
10 -14 dana kasnije	 Čađava krastavost Pepelnica Jabukin smotavac	Captan 50WP (0,25%) + Topas 100 EC (0,025%) + Actellic (0,1%)
15 dana pred berbu	 Trulež plodova  Smotavac pokožice	Funomil (0,1%) ili Stroby (200 g/ha) + Cythrin (0,03%)
Po potrebi	 Grinje	Demitan 200 SC (0,06%) ili Sanmite 20 WP (0,075%)
Suzbijanje korova	 Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolistni korovi	Glifomark (4-12 l/ha) ili Cosmic 36 (4-12 l/ha)

# Vinova loza



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Bubrenje pupoljaka	Fomopsis	Funguran OH (0,5%)
Lastari dužine 10 cm	Fomopsis, Pepelnica v. loze, Eriofidne grinje	Dithane DG NeoTec (0,25%) ili Captan 80 WG (0,2%)+ Karathane EC (0,05%)+ Demitan (0,06%)
Pred cvetanje	Plamenjača v. loze, Pepelnica v. loze Grozđani moljci	Forum star (0,2%)+ Collis (0,03%-0,04%)+ Match 050 EC (0,1%)
Precvetavanje	Plamenjača v. loze, Pepelnica v. loze, Siva trulež	Ridomil Combi 45WG (0,2%) ili Ridomil Gold MZ 68WG (0,25%)+ Tilt 250 EC (0,015%) + Cantus (0,1-0,12%) ili Switch (0,6-0,8 kg/ha)
Formirane bobice	Plamenjača v. loze, Pepelnica v. loze, Grozđani moljci	Acrobat MZ WG (0,25%)+ Systhane (0,025%)+ Insegar 25 WP (400 g/ha)+ Micothiol disperss(0,3%)
Zatvaranje grozda	Siva trulež bobica, Plamenjača v. loze, Pepelnica v. loze	Cupra blau Z (0,3%)+ Microthiol disperss (0,4%)
Početak šarka	Plamenjača v. loze, Pepelnica v. loze, Siva trulež, Grozđani moljci	Blue Bordo (0,5%)+ Microthiol disperss (0,4%)
Suzbijanje korova	Višegodišnji i jednogodišnji travni i širokolisni korovi (vinogradi u 3. godini i stariji) Vinogradi u 2.god i stariji Vinogradi u zasnivanju	Glifomark(4-12 l/ha) ili Cosmic 36 (4-12 l/ha)  Agram (3-5 l/ha) Focus ultra (1,5-4 l/ha)

**NAPOMENA:** U fazi zatvaranja grozda vrši se zaseban tretman, u zoni grozda, fungicidom Pyrus 400 SC (0,2%) u cilju zaštite od sive truleži. Na isti način i u fazi šarka treba tretirati fungicidom Switch 62,5 WG, takođe zbog zaštite od sive truleži. U ovom tretmanu može se dodati insekticid Vantex 60 CS (60ml/ha)- ukoliko je populacija grožđanog moljca i dalje velika. U cilju sprečavanja širenja bolesti tipa fitoplazmoza, u periodu druge do treće dekade juna, treba izvršiti tretman protiv cikada (Nurell D 0,1%). Sledeći tretman treba izvršiti između druge i treće dekade jula (Vantex 60 CS 60 ml/ha)

## **Fitofert folijarna prihrana jabuke**

<b>stadijum</b>	<b>preparat</b>	<b>koncentracija</b>
Zeleni buketiči	FitoFert Zink Organo 14	2 kg/ha
Pred cvetanje	FitoFert BOR MAX 20	1 kg/ha
Cvetanje	BM 86 + FitoFert BOR MAX 20	4 l/ha + 1 kg/ha
Precvetavanje	BM 86 + FitoFert Kristal 10:40:10	4 l/ha + 5 kg/ha
Precvetavanje	FitoFert Ultra 20:20:20	5 l/ha
Plod veličine lešnika	FitoFert CALCIUM 15	5 l/ha
Plod veličine oraha	FitoFert CALCIUM 15	5 l/ha
2. Dekada Jula	FitoFert Kristal 10:40:10	5 kg/ha
Odrasli plodovi	FitoFert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Plodovi u zrenju	FitoFert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Nakon 10-14 dana	FitoFert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Pred berbu	FitoFert Kristal 4:10:40	5 kg/ha
Zreli plodovi	FitoFert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha

## **Fitofert folijarna prihrana vinove loze**

<b>stadijum</b>	<b>preparat</b>	<b>koncentracija</b>
Lastari dužine do 10 cm	FitoFert Ultra 20:20:20	5 l/ha
Pred cvetanje	FitoFert BOR MAX 20	1 kg/ha
Pred cvetanje	FitoFert Kristal 10:40:10	5 kg/ha
Precvetavanje	FitoFert BOR MAX 20	1 kg/ha
Formiranje bobica	FitoFert Ultra 20:20:20	5 l/ha
Zatvaranje grozda	FitoFert Kristal 4:10:40	5 kg/ha
7-10 dana kasnije	FitoFert Kristal 4:10:40	5kg/ha
7-14 dana kasnije	FitoFert Kristal 4:10:40	5 kg/ha
Stone sorte	FitoFert Calcium organo (2-3 x)	3 kg/ha

## **Fitofert folijarna prihrana breskve i šljive**

<b>stadijum</b>	<b>preparat</b>	<b>koncentracija</b>
Roze pupoljak	FitoFert Zink Organo 14	2 kg/ha
Pun cvet	BM 86+FitoFert BOR MAX 20	4 l/ha + 1 kg/ha
Precvetavanje	FitoFert Kristal 10:40:10	5 kg/ha
Plod veličine lešnika	FitoFert Ultra 20:20:20	5 l/ha
7 – 10 dana kasnije	FitoFert CALCIUM 15	5 l/ha
7 – 10 dana kasnije	FitoFert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Plodovi u zrenju	FitoFert Kristal 4:10:40	5 kg/ha
7 – 10 dana kasnije	FitoFert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Zreli plodovi	FitoFert Kristal 4:10:40	5 kg/ha

# Breskva



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Bubrenje pupoljaka	Šupljikavost lista, Kovrdžavost lišća, Jaja štetočina	Cuprablau Z (0,5%) ili Funguran-OH (0,4%) + Galmin (2,0%)
Zelena tačka na vrhu letorasta	Kovrdžavost lista	Syllit 400 SC (0,25%) ili Delan 700 WG (0,07%) ili Bravo 720 SC (0,2%)
Roze pupoljak	Kovrdžavost lista, Pepelnica breskve, Trips	Delan 700 WG (0,07%) + Karathane EC (0,05%) + Vantex 60 CS (60 ml/ha)
Cvetanje	Monilija	Signum (0,07%)
Precvetavanje	Šupljikavost lista, Lisne vaši, trips	Agrobin 60WP (0,1%) + Actara 25 WG (200 g/ha)
Plod veličine lešnika	Šupljikavost lista, Pepelnica breskve, Breskvin smotavac	Captan 80 WG (0,2%) + Systhane 12 E (0,035%) + Nurelle-D (0,1%)
Nakon proređivanja plodova	Trulež plodova Dudova štitasta vaš	Signum (0,07%) + Nurelle-D (0,1%)
Porast plodova (12-15 dana kasnije)	Šupljikavost lista, Trulež plodova, Dudova štitasta vaš, Breskvin moljac, smotavac	Dithane DG Neo TEC (0,25%) + Funomil (0,07%) + Insegar 25 WG (0,06%)
Porast plodova (15 dana kasnije)	Šupljikavost lista, Breskvin smotavac	Topas 100 EC (0,025%) + Captan 80 WG (0,2%) + Afinex 20 SP (0,025%)
10-15 dana pred berbu	Trulež plodova, Breskvin moljac	Switch 62,5 WG (0,08%) + Vantex 60 CS (60 ml/ha)
Jesenji tretman	Rešetavost lista, Kovrdžavost lista	Cuprablau Z (0,5%) ili Blue Bordo (1,5%)
Suzbijanje korova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Višegodišnji korovi „Hemijsko košenje“	Focus ultra (1,0 – 3,0 l/ha) ili Kletox (0,8–2,0 l/ha) Cosmic 36 (4,0–10 l/ha) Agram (3,0–5,0 l/ha)

# Šljiva



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Rano prolećno prskanje (bubrenje pupoljaka)	Rogač šljive, Šupljikavost, Prezimljujuće forme štetočina(jaja)	Cuprablau Z (0,50%) ili Funguran-OH (0,5%) + * Galmin (1,5-2,5%)
Zatvoreni cvetovi „bele koke“	Sušenje cvetova i rodnih grančica - monilioza	Funomil (0,07%) ili Signum (0,07%)
Cvetanje	Sušenje cvetova i rodnih grančica	Signum (0,07%) ili Pyrus 400 SC (0,20-0,25%)
Precvetavanje	Plamenjača šljive, Šljivine ose, Lisne vaši	* Dithane M-45 (0,20%) + Nurelle-D (0,10%)
Formiran plod	Šupljikavost lišća, Šljivin smotavac, Lisne vaši	Captan WG-80 (0,20%) + Afinex 20 WP (0,025%) + Vantex 60 CS (0,005%)
10 do 15 dana kasnije	Trulež plodova Šljivin smotavac	Funomil (0,07%) + Nurelle-D (0,1%)
Promena boje ploda	Trulež plodova, Šljivin smotavac, Lisne vaši	Switch 62,5-WG (0,06%) + Vantex 60 CS (0,005%)
Jesenji tretman	„Plavo prskanje“	Cuprablau Z (0,5%)
Suzbijanje korova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Višegodišnji korovi „Hemijsko košenje“	Focus ultra (1,0–3,0 l/ha) ili Kletox (0,8–2,0 l/ha) * Cosmic 36 (4,0–10 l/ha) Agram (3,0–5,0 l/ha)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanih pesticida za primenu u šljivi, osim označenih \* to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU

# Višnja, trešnja



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Zimsko prskanje	Patogeni Prezimljavajuće forme štetočina	Cuprablau Z (0,5%) ili Funguran-OH (0,4%) + Galmin (1,5 – 2,5%)
Početak cvetanja «bele koke»	 Monilija, Lisna pegavost, Surlaš, mrazovac	Signum (0,07%) ili Funomil (0,07%) + Vantex 60 CS (0,005%)
Cvetanje	 Monilija	Signum(0,06-0,075%) ili Pyrus 400SC (0,2-0,25%)
Formiranje ploda «zrno graška»	 Lisna pegavost Surlaš, vaši	Delan 700 WG (0,075%) + Nurelle-D (0,1%)
10-15 dana kasnije	 Lisna pegavost Trešnjina muva	Agrodin 60WP (0,1%) ili Syllit 400 SC (0,2%) + Actara 25 WG (0,02%) ili Afinex 20SP (0,025%)
Promena boje ploda	 Monilinia ploda Gorka trulež Trešnjina muva	Switch 62.5 WG (0,06%) + Vantex 60 CS (0,005%)
7 dana pred berbu	Trešnjina muva-po potrebi	Actellic (0,1%)
Posle berbe	Lisna pegavost	Dithane DG NeoTEC (0,25%) ili Agrodin 60 WP (0,1%)
Jesenji tretman	„Plavo prskanje“	Cuprablau Z (0,5%)
Suzbijanje korova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Višegodišnji korovi „Hemijsko košenje“	Focus ultra (1,0 – 3,0 l/ha) ili Kletox (0,8 – 2,0 l/ha) Cosmic 36 (4,0 – 10 l/ha) Agram (3,0 – 5,0 l/ha)

## Fitofert folijarna prihrana trešnje i višnje

stadijum	preparat	koncentracija
Cvetanje	BM 86+Fitofert BOR MAX 20	4 l/ha + 1 kg/ha
Precvetavanje	Fitofert Kristal 10:40:10	5 kg/ha
Plod veličine lešnika	Fitofert Ultra 20:20:20	5 l/ha
7 – 10 dana kasnije	Fitofert CALCIUM 15	5 l/ha
7 – 10 dana kasnije	Fitofert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Plodovi u zrenju	Fitofert Kristal 4:10:40	5 kg/ha
7 – 10 dana kasnije	Fitofert CALCIUM ORGANO 30	3 kg/ha
Zreli plodovi	Fitofert Kristal 4:10:40	5 kg/ha

## Fitofert folijarna prihrana jagode

stadijum	preparat (FERTIGACIONO)	kg/ha/faza	preparat (FERTIGACIONO)	količina
Sadnja (letnja)	Fitofert Kristal 10:40:10	0.1% zaliti	Fitofert HUMISUPER 10:5:10	2 l/ha
Vegetacija do cvetanja	Fitofert Ultra 20:20:20	80	Fitofert HUMISUPER 10:5:10 Fitofert BOR MAX 20	2 l /ha 1 kg/ha
Formiranje i rast plodova	Fitofert Kristal 16:11:24	100	Fitofert CALCIUM ORGANO 30 Fitofert HUMISUPER 10:5:10	3 kg/ha 2 l/ha
Pojava pigmentacije	Fitofert Kristal 4:10:40	30-40	Fitofert Calcium 15	5 l/ha
Posle berbe do kraja veget.	Fitofert Ultra 20:20:20	20-30	Fitofert Calcium Organo 30	3 kg/ha

## Fitofert folijarna prihrana maline i kupine

stadijum	preparat (FERTIGACIONO)	kg/ha/faza	preparat (FERTIGACIONO)	količina
Vegetacija do cvetanja	Fitofert Ultra 20:20:20	60-70	Fitofert HUMISUPER 10:5:10 Fitofert BOR MAX 20	2 l/ha 1 kg/ha
Početak cvetanja	Fitofert Kristal 16:11:24	20-30	Fitofert BOR MAX 20	1 kg/ha
Formiranje i rast plodova	Fitofert Kristal 16:11:24	80	Fitofert Calcium 15	5 l/ha
Pojava pigmentacije	Fitofert Kristal 4:10:40	30-40	Fitofert HUMISUPER 10:5:10	2 l/ha
Posle berbe do kraja veget.	Fitofert Ultra 20:20:20	30-50	Fitofert Calcium Organo 30	3 kg/ha
			Fitofert Calcium Organo 30	3 kg/ha

# Jagoda



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Početak vegetacije	Pegavost lista	Cuprablau Z (0,35%) ili Funguran-OH (0,3%)
Pred cvetanje 	Pegavost lista Lisne vaši	Captan 80 WG (0,20%) + Vantex 60 CS (60 ml/ha) ili Afinex 20 SP (0,025%)
Početak cvetanja 	Pegavost lista Siva trulež	* Signum (1,0 kg/ha) ili Pyrus 400 SC (0,20 – 0,25%)
10 – 15 dana kasnije 	Siva trulež	Switch 62,5 WG (0,08%)
Po precvetavanju 	Siva trulež Lisne vaši Jagodin rilaš	Switch 62,5 WG (0,08%) + Actara 25 WG (200 g/ha) ili Afinex 20SP (0,025%)
Posle berbe 	Pegavost lista Lisne vaši	Dithane DG NeoTec (0,25%) + Nurelle-D (0,10%)
Suzbijanje korova	Inkorporacija na 2-4 cm  Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni	* Devrinol 45-F (3,0–4,0 l/ha) + Focus ultra (1,0 – 3,0 l/ha) ili Kletox (0,8 – 2,0 l/ha)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanih pesticida za primenu u jagodi, osim označenih \* to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU

# Malina



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Zimsko prskanje	Sušenje izdanaka, Didimela, Antraknoza, Malinin moljac	Cuprablau Z (0,35%)+ Galmin (1,0–2,0%)
Listanje	Sušenje izdanaka, Didimela, Grinje	Funguran-OH (0,3%) + Microthiol disperss (0,40%)
Diferencijacija cvetova	Sušenje izdanaka, Didimela, Lisne vaši	Captan WP-50 (0,25%) + Actara 25 WG (0,02%) ili Afinex 20SP (0,02%)
Početak cvetanja	Didimela, Sušenje izdanaka,  Lisne vaši, Malinin cvetojed	* Switch 62,5 WG (0,08%) ili * Signum (0,15%) + * Quadris (0,075%)+ Nurelle-D (0,15%)
7 dana pred berbu	Siva trulež	Switch 62,5 WG (0,08%)
Odmah po završenoj berbi	Didimela, Sušenje izdanaka, Muva galica, Malinina mušica, Grinje	Dithane DG NeoTec (0,25% ) + Actara 25 WG (0,02%) + Demitan (0,06%) ili Sanmite 20 WP (0,06%)
Tokom septembra meseca	Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Štetni insekti	Cuprablau Z ( 0,35 % ) + Nurelle-D (0,10%)
Suzbijanje korova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, „Hemijsko košenje“	Focus ultra (1,0–3,0 l/ha) ili Kletox (0,8–2,0 l/ha) + Agram (3,0–5,0 l/ha)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanih pesticida za primenu u malini, osim označenih \* to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU

# Kupina



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Početak listanja ( $t > 11^{\circ}\text{C}$ )	Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Antraknoza, Štetočine stabla, grinje	Cuprablau Z (0,35%) ili Funguran-OH (0,3%) + Galmin (1,0–2,0%)
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova	Ljubičasta pegavost, Rđa kupine, Fomopsis, Štetočine stabla, Lisne vaši	Dithane DG NeoTec (0,25%) + Tilt 250 EC (0,015%) + Vantex 60 SC (60 ml/ha)
Pred cvetanje	Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Rđa kupine, Siva trulež, Štetni insekti	Score 250 EC (0,015%) + Pyrus 400 SC (0,20%) + Nurelle-D (0,10%)
7 dana pred berbu	Siva trulež	Switch 62,5 WG (0,08%)
Po završenoj berbi	Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Fomopsis, Rđa kupine, Štetočine stabla  Grinje	Dithane DG NeoTec (0,25%) + Tilt 250 EC (0,015%) +  Actara 25 WG (0,02%) ili Afinex 20SP (0,025%) + Sanmite 20WP (0,06%)
Sredinom septembra	Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka, Grinje	Cuprablau Z (0,35%) + Nurelle-D (0,10%)
Suzbijanje korova	Inkorporacija na 2-4 cm Jednogodisnji i višegodišnji uskolisni korovi „Hemijsko košenje“	Devrinol 45-F (3,0–4,0 l/ha)  Focus ultra (1,0–3,0 l/ha) Agram (3,0–5,0 l/ha)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanih pesticida za primenu u kupini, to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU.




# Kruška



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre kretanja vegetacije	Bakterioze, Kruškina buva (početak aktivnosti T >10 °C)	Cuprablau Z (0,5%) ili Funguran (0,4%)+ Vantex 60 CS (60 ml/ha)+ Galmin(2-3%)
„Mišje uši“	Čađava krastavost, Kruškina buva	Dithane M 70 (0,3%)+ Match 050 EC (0,1%)+ Nu film (0,1 %)
Beli pupoljci	Čađava krastavost, Voćne pipe,osa	Dithane M- 70 (0,3%)+ Nurelle D(0,1%)
Cvetanje	Čađava krastavost	Stroby DF(0,02%)
Precvetavanje	Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške, Osa, smotavac pokožice ploda	Captan 80 WG (0,2%)+ Score 250EC (200 ml/ha)+ Nurelle D (0,1%)
Porast plodova (druga polovina maja)	Čađava krastavost, Siva pegavost, Rđa kruške, Jabukin smotavac, Kruškina buva, lisni mineri	Dithane M 70 (0,3%)  Insegar 25 WG (0,1%)+ Abastate (0,1%)+ Galmin (1,0 %)
Porast plodova (sredina juna)	Čađava krastavost, Smotavac pokožice ploda	Delan 700 WG (0,05%)+ Match 050 EC (0,1%)+ Nu film (0,1%)
Porast plodova (prva polovina jula)	Čađava krastavost, Kruškin smotavac, Kruškina buva	Captan 80 WG (0,2%) Nurelle-D (0,1%) -za kasnije sorte
15 dana pred berbu	Trulež plodova,  Jabukin smotavac	Funomil (0,07%) ili Flint plus (1,85 kg/ha)+ Vantex 60 CS( 60ml/ha)
Suzbijanje korova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Višegodišnji korovi „Hemijsko košenje“	Focus ultra (1,0–3,0 l/ha) ili Kletox (0,8 – 2,0 l/ha) Cosmic 36 (4,0 – 10 l/ha) Agram (3,0–5,0 l/ha)

# Borovnica



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Mirovanje vegetacije	 Sušenje letorasta Rak stabla, siva trulež Monilioza, antraknoza Prezimljujuće forme insekata i grinja (jaja)	Cuprablau Z (0,35%) + Galmin (1,0-2,0%)
Pucanje pupoljaka	 Palež letorasta, Rak-rane, antraknoza Grinje	Captan WP 50 (0,25%) + Demitan 200 SC (0,06%) ili Sanmite 20 WP (0,06%)
Pred cvetanje	 Monilioza cveta, siva trulež Lisne vaši, cvetojed Mušica	Signum (0,06%) + Actara 25 WG (0,02%)
U punom cvetu	 Siva trulež, monilioza	Switch 62,5 WG (0,08%)
Pred početak zrenja	 Monilioza ploda, siva trulež Lisne vaši	Switch 62,5 WG (0,08%) + Actara 25WG (0,02%)
Posle berbe	 Patogeni lista i izdanka, Pepelnica Lisne vaši i drugi insekti	Captan WP 50 (0,25%) + Nurelle-D (0,10%)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanih pesticida za primenu u borovnici, to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU.

# Ribizla



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Zimsko mirovanje - kraj februara	Givične bolesti Grinje Prezimljujuće forme insekata	Cuprablau Z (0,35%) ili Funguran-OH (0,3%) + Galmin (1,0-2,0%)
Bubrenje i otvaranje pupoljaka	Antraknoza, rđa Septorioza Grinje	Captan WP-50 (0,25%) + Demitan (0,06 %) ili Sanmite 20WP (0,06%)
Porast letorasta - pred cvetanje	Pepelnica, rđa, Antraknoza Biljne vaši, grinje Staklokrilac	Delan 700 WG (0,05%) + Strobi DF (0,02%) + Nurelle-D (0,10%)
Posle precvetavanja	Pepelnica, rđa, antraknoza Staklokrilac, biljne vaši, Galice, pedomerka	Captan WP (0,25%) + Score 250 EC (0,02%) + Actara 25 WG (0,02%) ili Afinex 20 SP (0,02%)
Posle berbe	Rđa, antraknoza Pedomerke, grinje	Bravo 720 SC (0,20%) + Actara 25 WG (0,02%) + Demitan (0,06%) ili Sanmite 20WP (0,06%)
Opadanje lišća	Gljivične bolesti	Cuprablau Z (0,35–0,50%)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema zvanično registrovanih pesticida za primenu u ribizli, to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU

# Ruže i ukrasno bilje



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
30 dan pre setve ili sadnje	Suzbijanje korova	Glifomark/Cosmic 36 (4,0-10 l/ha)
Pre setve ili sadnje, po rasađivanju	Bolesti poleganja	Proplant 722 SL (0,25-0,37%)
Pre setve ili sadnje	Zemljišne štetočine	Force 0,5 G (0,15kg/100 m <sup>2</sup> )
Porast biljke	Pepelnica	Karathane EC (0,05%)
	Rđa, pegavost	Flint plus (0,15%)
	Lisne vaši	Actara 25 WG (0,2%)
	Pepelnica, pegavosti	Systhane 12 E (0,04%)
	Štotočine lista i cveta	Actellic (0,1%)
Po potrebi	Pepelnica, rđa, pegavosti	Microthiol disperss (0,3%) + Flint plus (0,15%)
	Grinje	Demitan 200-SC (0,04%) ili Sanmite 20 WP (0,05%)
	Suzbijanje uskolisnih korova	Focus ultra (1,0-4,0 l/ha)

**NAPOMENA:** Pošto na tržištu Srbije nema dovoljno zvanično registrovanih pesticida za primenu u cveću i ukrasnom bilju, to je ovaj program sačinjen na bazi registracije, preporuka i iskustva u zemljama EU

# Paradajz



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve/rasađivanja	Bolesti polaganja rasada Zemljišne štetočine Korovske vrste	Proplant 722 SL (0,15 %) Force 0,5 G (20-25 kg/ha) Devrinol 45 F (2,5-4,0 l/ha)
Po rasađivanju	Štetočine lisne mase Bolesti polaganja rasada Stimulator oplodnje	Actara 25 WG (0,2 kg/ha) Proplant 722 SL (0,15 %) BM 86 (3,0 l/ha)
Kotiledoni listovi do 9 lista	Plamenjača Štetočine lista Uskolisne korovske vrste Puževi	Bravo 720 SC (2,0 l/ha) Nurelle D (0,1%) Focus ultra (0,7 – 4,0 l/ha) ili Kletox (0,8-2,0 l/ha) Gardene (5,0-7,0 kg/ha)
Razvijen 9 list do pred cvetanje	Plamenjača, Crna pegavost, Plesnivost lista	Folio Gold 537,5 SC (3,0 l/ha) + Signum (0,4 kg/ha) + Signum (0,7 kg/ha)
Pred cvetanje do 1. otvorenog cveta	Plamenjača, Siva trulež Lisne vaši Stimulator oplodnje	RidomilGold MZ68WG (2,5 kg/ha) + Switch 62,5 WG (0,6-0,8 kg/ha) Vantex 60 CS (0,05 l/ha) BM 86 (3,0 l/ha)
Cvetanje	Plamenjača, Crna pegavost, Siva trulež	Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) + Score 250EC (0,5 l/ha) + Switch 62,5 WG (0,6-0,8 kg/ha)
Plodonošenje	Vaši Plamenjača, Bakterioze Lisne vaši	Afinex 20SP (0,125-0,25 kg/ha) Dithane M 70 (2,5 kg/ha) + Funguran OH (1,5 kg/ha) Actellic 50 (0,05-0,1%)


# Paprika



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve/ rasađivanje	Bolesti poleganja rasada Zemljišne štetočine Korovske vrste	Proplant 722 SL (0,15%) Force 0,5 G (20-25 kg/ha) Devrinol 45 F (2,5-4,0 l/ha) inkorporacija
Po rasađivanju	Štetočine lisne mase Bolesti poleganja rasada Stimulator oplodnje	Actara 25 WG (0,2 kg/ha) Proplant 722 SL (0,15%) BM 86 (3,0 l/ha)
Kotiledoni listovi do 9. lista	Plamenjača Bakterioze Štetočine lista Puževi Uskolisne korovske vrste	Bravo 720 SC (2,0 l/ha) + Cuprablau Z (3,0 kg/ha) Nurelle D (0,1%) Gardene (5,0-7,0 kg/ha) Focus Ultra (0,7-4,0 l/ha) ili Kletox (0,8-2,0 l/ha)
Razvijen 9. list do pred cvetanja	Plamenjača, Crna pegavost	Bravo 720 SC (2,0 l/ha)
Pred cvetanje do 1. otvorenog cveta	Plamenjača Bakterioze Lisne vaši Simulator oplodnje	Dithane DG NeoTec (2,5 kg/ha)+ Funguran OH (1,5 kg/ha) Vantex 60 CS (0,05 l/ha) BM 86 (3,0 l/ha)
Cvetanje	Siva trulež	Signum (1,0 kg/ha)
Plodonošenje	Vaši, bela leptirasta vaš Plamenjača Bakterioze Siva trulež Lisne vaši	Chess 50 WG (0,4-0,6%) Dithane M 70 (2,5 kg/ha)+ Cuprablau Z Ultra (2,0 kg/ha)+ Signum (1,0 kg/ha) Actellic 50 (0,05-0,1%)

# Krastavac, lubenica, dinja, tikva



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve/rasađivanja	Suzbijanje korova Bolesti poleganja rasada Zemljišne štetočine	Devrinol 45-F (2,0-4,0 l/ha) Proplant 722 SL (0,15 %) Force 0,5 G (20-25 kg/ha)
Po rasađivanju	Štetočine lisne mase Bolesti poleganja rasada Stimulator oplodnje	Actara 25WG (0,2 kg/ha) Proplant 722 SL (0,15 %) BM 86 (3,0 l/ha)
Kotiledoni do 3 prva razvijena lista	 Plamenjača Pepelnica	Bravo 720 SC (2,0 l/ha)+ Karathane EC (0,04 %)
Razvijen 4. list do pred cvetanje	 Plamenjača, Pepelnica Grinje Uskolisne korovske vrste	Ridomil Gold MZ68WG (2,5 kg/ha)+ Systhane 12 E (0,04%)  Demitan 200 SC (0,04-0,06%)  Focus ultra (0,7 – 4,0 l/ha)ili Kletox (0,8-2,0 l/ha)
Pred cvetanje do 1. otvorenog cveta	Plamenjača Pepelnica Siva trulež  Simulator oplodnje	Fostonic 80WP (0,25-0,37%)+ Systhane 12 E (0,04 %)+ Signum (0,7 kg/ha)  BM 86 (3,0 l/ha)
Cvetanje	 Plamenjača Pepelnica Vaši	Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha)+ Microthiol disperss (0,3 %)  Actellic (0,5-1,0 l/ha)
Plodonošenje	 Plamenjača Bakterioze Pepelnica	Cuprablau Z Ultra (2,5 kg/ha)+ Dithane M-45 (2,0 kg/ha)  Microthiol disperss (0,3 %)

## Fitofert u ishrani paradajza

stadijum	preparat (FERTIGACIONO)	g/100 m <sup>2</sup> /ned	preparat (FOLIJARNO)	koncent.
Prilikom Rasađivanja	FitoFert Kristal 10:40:10	200	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.2%
Nakon rasađivanja do cvetanja	FitoFert Ultra 20:20:20	500	FitoFert BOR MAX 20	0.15-0.2%
Formiranje prvih plodova	FitoFert Kristal 16:11:24	500	FitoFert Calcium 15 FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.5% 0.2%
Intenzivan rast plodova	FitoFert Kristal 16:11:24	800	FitoFert Calcium Organo 30 FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.3% 0.2%
Pojava pigmentacije plodova	FitoFert Kristal 4:10:40	500	FitoFert Calcium Organo 30	0.3%
Tokom Berbe	FitoFert Kristal 4:10:40	500		

## Fitofert u ishrani paprike

stadijum	preparat (FERTIGACIONO)	g/100 m <sup>2</sup> /ned	preparat (FOLIJARNO)	koncent.
Sadnja ukorenjavanje	FitoFert Kristal 10:40:10	200	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.2%
Nakon ukorenjavanja do cvet.	FitoFert Ultra 20:20:20	600	FitoFert BOR MAX 20	0.15-0.2%
Razvoj prvih plodova	FitoFert Kristal 16:11:24	800	FitoFert Calcium 15 FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.5% 0.2%
Tokom berbe	FitoFert Kristal 16:11:24	500	FitoFert Calcium Organo 30	0.3%
Pre pojave pigmentacije kod crvene paprike	FitoFert Kristal 4:10:40	300	FitoFert Calcium Organo 30	0.3%

## Fitofert u ishrani krastavca

stadijum	preparat (FERTIGACIONO)	g/100 m <sup>2</sup> /ned	preparat (FOLIJARNO)	koncent.
Sadnja	FitoFert Kristal 10:40:10	0.2% zaliti		0.2%
Ukorenjavanje (nicanje kornišona)	FitoFert Kristal 10:40:10	200	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.15-0.2%
				0.5%
Nakon ukorenjavanja do cvet.	FitoFert Ultra 20:20:20	600	FitoFert BOR MAX 20 FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.2% 0.3%
Period intenzivnog rasta	FitoFert Kristal 16:11:24	800	FitoFert Calcium 15 FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.3%
Tokom Berbe	FitoFert Kristal 16:11:24	800	FitoFert Calcium Organo 30	

# Krompir



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve, Setva	Zemljišne štetočine	Force 0,5 G (20 kg/ha)
Po setvi, pre nicanja	Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Dual gold 960 EC (1,3 l/ha) + Girasolin (2,0-4,0 l/ha)
Posle nicanja (Porast krompira do 25 cm)	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Plamenjača, lisna pegavost	Focus ultra (1,0-3,0 l/ha) ili Targa super (1-3 l/ha) Bentamark (2,0-3,0 l / ha) Bravo 720 SC (2,0 l / ha)
Zatvaranje redova Diferencijacija cvetova	Plamenjača, lisna pegavost Krompirova zlatica	RidomilGold MZ68WG (3kg/ha) ili Folio Gold 537,5 (2,5 l / ha) Actara 25 WG (80 g / ha )
Puno cvetanje	Plamenjača, lisna pegavost, Krompirova zlatica	RidomilGold MZ68WG (3kg/ha) ili Acrobat MZ WG (2,0-2,5 kg / ha) + Actara 25 WG (80 g/ha ) ili Afinex 20 SP (250 g/ha)
Precvetavanje	Plamenjača, Krompirova zlatica, Biljne vaši	Revus 250 SC (0,6 l/ha) + Match 050 EC (0,3 l/ha) + Nurelle-D (1,0 l/ha)
15 dana kasnije	Plamenjača, Lisna pegavost	Revus 250 SC (0,6 l/ha) ili Acrobat MZ WG (2,0-2,5 kg/ha)
Nalivanje krtola	Plamenjača, lisna pegavost	Shirlan (0,4 l/ha)
Fiziološka zrelost	Desikacija cime	Reglone forte (4,0 – 5,0 l/ha)
Po vađenju krompira, a pre skladištenja	Klijanje krompira	Neo Stop (100 g/100 kg krompira)

# Fitofert preporuke za uzgoj krompira

stadijum	preparat (FOLIJARNO)	količina
Posle nicanja (porast krompira do 25 cm)	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	2/ha
Zatvaranje redova	FitoFert Ultra 20:20:20	5 l/ha
Jasno izdvojene cvasti	FitoFert BOR MAX 20 FitoFert Kristal 16:11:24	2 kg/ha 5 kg/ha
Puno cvetanje	FitoFert Kristal 16:11:24	5 kg/ha
Precvetavanje	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	2 l/ha
Nalivanje krtola	FitoFert Kristal 4:10:40 FitoFert Kristal 4:10:40	5 kg/ha 5 kg/ha

# Fitofert u ishrani lubenice i dinje

stadijum	preparat (FERTIGACIONO)	g/100 m <sup>2</sup> /ned	preparat (FOLIJARNO)	koncent.
Presadivanje	FitoFert Kristal 10:40:10	0.1% zaliti		
Ukorenjavanje 20 dana	FitoFert Ultra 20:20:20	15	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.2%
Intenzivni rast do cvetanja	FitoFert Kristal 16:11:24	20	FitoFert BOR MAX 20	0.15-0.2%
Prvi cvetovi	FitoFert Kristal 16:11:24	25	FitoFert Calcium 15 FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.5% 0.2%
Plod 1/3 Veličine	FitoFert Kristal 4:10:40	40-50	FitoFert Calcium Organo 30	0.3%
Plod 12/veličine	FitoFert Kristal 4:10:40	40-50	FitoFert Calcium Organo 30	0.3%

# Mahunsto povrće






faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve	Zemljišne štetočine	Force 0,5 G (20-25 kg/ha)
Suvo seme	Korovske biljke	Dual Gold 960EC (1,5 l/ha) + Prometrin-SC (2,0 l/ha)
Razvijen I par listova do I cvetnog pupoljka	Lisne vaši Korovske vrste Plamenjača, pegavost lista, bakterioze Plamenjača, pegavost lista, bakterioze	Vantex 60 CS (0,05%) Focus ultra (0,7 – 4,0 l/ha) + Bentamark (1,5 - 2,5 l/ha) Folio Gold 537,5 SC (3,0 l/ha) Cuprablau Z (3,0 kg/ha)
Pred cvetanje do cvetanja	Žižak Stimulator oplodnje	Nurelle D (1,0 l/ha) BM 86 (3,0 l/ha)
Precvetavanje	Siva i bela trulež Stimulator oplodnje	Signum (0,7 kg/ha) BM 86 (3,0 l/ha)

## Fitofert preporuke za uzgoj mahunastog povrća (pasulj, grašak, boranija)

stadijum	preparat (FOLIJARNO)	količina
Razvijenih prvi par listova do prvog pupoljka	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	2 l/ha
Pred cvetanje	FitoFert BOR MAX 20 FitoFert Kristal 16:11:24	2 kg/ha 5 kg/ha
Precvetavanje	FitoFert HUMISUPER 10:5:10 FitoFert Calcium Organo 30	2 l/ha 3 kg/ha

# Kupusasto povrće



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve / rasađivanja	Bolesti poleganja Zemljišne štetočine Korovske biljke	Proplant 722-SL (0,15 %) Force 0,5 G (20-25 kg/ha) Devrinol 45F (2,0 – 4,0 l/ha) inkorporacija
Po rasađivanju	 Štetočine lisne mase	Actara 25WG (zalivanje) 0,15 – 0,55 kg/ha
Treći list do formirano 30% glavice	 Plamenjača Korovske vrste Puževi Lisne vaši	Folio Gold SC (2,5–3,0 l/ha) Focus ultra (0,7 – 4,0 l/ha) ili Kletox (0,8-2,0 l/ha) Gardene (5,0-7,0 kg/ha) Chess 50 WG (0,4-0,6 kg/ha)
Glavica formirana 30 do 70%	 Plamenjača Bakterioze Lisne sovice i kupusar	Bravo 720 SC (2,0 l/ha) Cuprablau Z (3,0 kg/ha)+ Dithane DG Neo Tec (2,5 kg/ha) Afinex 20 SP (0,2-0,4 kg/ha)
Cvetanje formirani plodovi	 Buvači, vaši	Vantex 60 CS (0,05-0,07 l/ha)


## Fitofert preporuke za uzgoj kupusnjača

stadijum	preparat	koncentracija
Prilikom rasađivanja	FitoFert Kristal 10:40:10	0.2% zaliti
Nakon rasađivanja, faza 2-4 lista	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	0.2%
3. list do 30% od formirane glavice	FitoFert BOR MAX 20 FitoFert Kristal 16:11:24	0.15-0.2% 0.3%
70 % Formirane glavice	FitoFert Calcium Organo 30	0.3%
70 % Formirane glavice	FitoFert Kristal 4:10:40	0.3%

# Mrkva, paštrnak, peršun, celer



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve	Bolesti poleganja rasada Suzbijanje korova Zemljišne štetočine	Proplant 722-SL (0,15%)  Glifomark (4,0-6,0 l/ha) ili Cosmic 36 (4,0-6,0 l/ha)  Force 0,5 G (20-25 kg/ha)
Suvo seme po setvi pre nicanja	Korovske biljke	Dual Gold 960 EC (1,2 l/ha)
Razvoj I do III lista	Korovske biljke	Prometrin SC (1,5 l/ha)
Razvijen treći list, koren dostiglo 30% od krajnjeg prečnika	Pegavost lista Bela trulež Pepelnica  Uskolisne korovske vrste (korovi 3-6 listova)	Bravo 720EC (2,0 l/ha) + Signum (1,0 kg/ha)  Focus ultra (0,7 – 4,0 l/ha) ili Kletox (0,8-2,0 l/ha)



## Fitofert preporuke za uzgoj korenastog i krtolastog povrća (šargarepa, celer, peršun, paštrnjak)

stadijum	preparat (FOLIJARNO)	količina
Posle nicanja razvoj prva tri lista	FitoFert HUMISUPER 10:5:10	2 l/ha
Razvijen treći list koren 30% prečnika	FitoFert BOR MAX 20 FitoFert Kristal 16:11:24	2 kg/ha 5 kg/ha
Intenzivni rast do vađenja korena	FitoFert Calcium Organo 30	3 kg/ha

# Lukovičasto povrće



faze zaštite	bolesti/štetočine	suzbijanje
Pre setve	Zemljišne štetočine – lukove muve	Force 0,5 G (20-25 kg/ha)
Sovo seme Arpadžik miruje	Korovske biljke	Dual Gold 960EC (1,2-1,3 l/ha) Prometrin SC (2,0 l/ha)
Razvijenih 2 do 5 listova	Lukove muve Plamenjača luka	Actara 25WG (0,2 kg/ha) Bravo 720SC (2,0 l/ha)
Razvoj lista i vegetativnog dela	Plamenjača luka Lukove muve Uskolisne korovske vrste	Folio Gold SC (3,0 l/ha) Nurelle D (0,1%) Focus ultra (0,7 – 4,0 l/ha) ili Kletox (0,8-2,0 l/ha)
Nalivanje glavica	Siva i bela trulež	Signum (0,7 kg/ha)
Razvoj vegetativnog dela	Plamenjača luka	Cuprablau Z Ultra (2,5 kg/ha)

**NAPOMENA:** Svi programi zaštite su orijentacionog karaktera i obuhvataju najznačajnije bolesti i štetočine. Konkretna primena na terenu zavisi od vremenskih uslova, aplikacije i pojave bolesti i štetočina. Agromarket ne snosi odgovornost za primenu ovih programa. Preporuka je da pre primene konsultujete stručnjake za zaštitu bilja.

# **Lucerka, crvena detelina, žuti zvezdan**

## **Zasnovani usevi**

<b>faze zaštite</b>	<b>intervencija</b>	<b>suzbijanje</b>
Pre kretanja vegetacije	Suzbijanje korova	Dancor 70 WG (0,7-1,2 kg/ha)
Prva troliska do 1. otkosa	Suzbijanje korova	Bentamark (3,0 l/ha) + Focus ultra (0,7-4,0 l/ha)
Po otkosu	Štetni insekti Suzbijanje viline kosice	Nurelle D (0,75-1,0 l/ha) Reglone forte (5,0 l/ha)
80% zrelih čaura	Desikacija	Reglone forte (4,0-6,0 l/ha)
Mirovanje vegetacije	Suzbijanje glodara	Gardentop (1-2 kesice za brojnost I-III 2-3 kesice kalamitet)

## **Usevi u zasnivanju**


<b>faze zaštite</b>	<b>intervencija</b>	<b>suzbijanje</b>
20 dana pre setve	Suzbijanje korova	Glifomark ili Cosmic 36 (4-6 l/ha)
Prva troliska	Suzbijanje korova	Bentamark (3,0 l/ha) + Focus ultra (0,7-4,0 l/ha)
Po 1. otkosu	Štetni insekti	Nurelle D (0,75-1,0 l/ha)
Po otkosu	Suzbijanje viline kosice	Reglone forte (4,0-6,0 l/ha)
Mirovanje vegetacije	Suzbijanje glodara	Gardentop (1-2 kesice za brojnost I-III 2-3 kesice kalamitet)

## **Travni usevi**

<b>faze zaštite</b>	<b>intervencija</b>	<b>suzbijanje</b>
20 dana pre setve	Suzbijanje korova	Glifomark ili Cosmic 36 (4-6 l/ha)
Prva troliska	Suzbijanje korova	Fluromark (1-1,5 l/ha)
Po 1. otkosu	Štetni insekti	Nurelle D (0,75-1,0 l/ha)
Po otkosu	Suzbijanje viline kosice	Agram (4,0 l/ha)
Mirovanje vegetacije	Suzbijanje glodara	Gardentop (1-2 kesice za brojnost I-III 2-3 kesice kalamitet)

Ukoliko se usevi kukuruza tretiraju herbicidom na bazi sulfonil urea za prihranu preporučujemo đubrivo FitoFert Liquid 12:4:6, zbog visokog sadržaja azota u amonijačno-nitratnom obliku. Koncentracija azota u dve navedene forme potpunosti neutrališe pesticidni šok. Količine primene 4 – 6 kg/ha. U fazi 4 – 6 listova preporučujemo tretman sa FitoFert Zn Organo 14, u koncentraciji 2 kg/ha, koji se može mesati sa herbicidima. U svim drugim slučajevima preporučujemo tretman preparatom FitoFert Ultra 20:20:20, u količinama od 4 – 6 l/ha.


## FITOFERT - folijarna ishrana



# KUKURUZ



# PŠENICA



## FITOFERT - folijarna ishrana

Prvi tretman u doba vlatanja, preparatom FitoFert Ultra 20:20:20, u količinama 4 – 6 l/ha.  
Najčešće u kombinaciji sa širokolistnim herbicidom Drugi tretman, ukoliko se tretira fuingicidom ili insekticidom, u fazi mlečne zrelosti, preparatom FitoFert 16:11:24, u količinama 4 - 6 kg/ha.

# SOJA

\* Kletox (0,8-2 l/ha)

Fokus Ultra (1-4 l/ha)

Targa Super (0,5-4 l/ha)

Pulsar 40 (1-1,2 l/ha)

\* Bentamark (2-4 l/ha)

\* Symphony (8 g/ha)


Frontier Super  
1-1,4 l/ha

Dual Gold 960  
1,4-1,5 l/ha

Acetohlor 900  
1,8-2,2 l/ha

Force 1,5g  
(5-8 kg/ha)  
Depozitorom  
pri setvi

**TRETMAN  
SEMENA**



Reglone Forte (2,5 - 3,5 l/ha) desikacija u vreme tehnološke zrelosti.


\* Označava da se po pozitivnom iskustvu preparati na bazi iste aktivne materije koriste uspešno u praksi za navedene namene.

**FITOFERT - folijarna ishrana**

Za prvo tretiranje useva soje prilikom herbicidnog tretiranja do prva tri trolistka preporučujemo Fitofert Ultra 20:20:20 u količinama 4 - 6 l/ha Sledeće tretiranje soje vršiti u kombinaciji sa fungicidnim tretmanom u periodu pre cvetanja soje i to preparatom Fitofert Bor MAX 20 u količini od 1 kg po hektaru. Bor na useve soje ima višestruki efekat: utiče na porast korena, poboljšava fiksaciju azota, podstiče razgranost i cvetanje, produžava trajanje i oplodnju cveta,

# SUNCOKRET

Frontier Super (1,0-1,4 l/ha)	* Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)
Acetohlor 900 (1,8-2,2 l/ha)	Focus Ultra (1,0 - 4,0 l/ha)
Acetomark (2-2,5 l/ha)	Targa Super (0,5 - 4 l/ha)
Dual Gold 960 EC (1-1,2 l/ha)	Vantex 60 CS (0,05 - 0,06 l/ha)
Force 1,5G (5-8 kg/ha) Depozitorom pri setvi	Nurelle D (1,0 l/ha)
Semafor 20ST 0,2 l/100 hg semena Cruiser 350FS 1 l/100 kg semena	* Pulsar 40 (1,2 l/ha) samo za IMI hibride
	TRETMAN SEMENA 00 08 10 12 15 18/22 51 55 57 61 63 67 80 86 89



Reglone Forte (2,5 - 3,5 l/ha) - desikacija u vreme tehnološke zrelosti.  
\* Označava da se po pozitivnom iskustvu preparati na bazi iste aktivne materije koriste uspešno u praksi za navedene namene.

## FITOFERT - folijarna ishrana

Useve suncokreta prilikom prolećnog herbicidnog tretmana obavezno prihraniti kombinacijom đubriva Fitofert Ultra 20:20 i Fitofert B0R 20 MAX i to u količinama od 4 – 6 kg / ha i 1 kg/ha. Visok sadržaj fosfora iz preparata Fitofert Ultra 20:20:20, utičaće kako na pravilno grananje korena tako i na kasnije inteziviranje cvetanja, dok će deponovana količina bora u mnogome pospešiti oplođenju zrna, a samim tim i broj zrna u cvetu.

# ŠEĆERNA REPA

Cruieser 350 FS (45 ml/s.j.)

Force 1,5G (5 - 8 kg/ha)  
Depozitorom pri setvi

Nurelle D (1,0-1,5 l/ha)

Rias 300 EC (0,4 l/ha)

Bravo 720 SC (2,0 l/ha)

\* Kletox (0,8 - 2,0 l/ha)

Focus Ultra (1,0 - 4,0 l/ha)

Targa Super (0,5 - 4,0 l/ha)

Trimark (30 - 40 g/ha)

Piralis (0,8 - 1,2 l/ha)

Frontier super  
(1 - 1,2 l/ha)

Dual Gold  
(1 - 1,2 l/ha)

TRETMAN  
SEMENA

01 07/09


21 13/15

22

23

43

90



\* Označava da se po pozitivnom iskustvu preparati na bazi iste aktivne materije koriste uspešno u praksi za navedene namene.

## FITOFFERT - folijarna ishrana

Kod šećerne repe posebo je izražena asimilacija: Kalijuma, Magnezijuma i Bora.


Primenom preparata FitoFert Bor MAX 20 u dva tretmana, početak Juna i sredina Jula, u količinama od 1kg/ha.

Efekti đubrenja preparatom FitoFert Bor MAX 20: otpornost na bolest truljenja srca repe, zdrav koren bez prisustva tragova truljenja, povećana digestija u proseku za 1.1% Paralelno uz preparat FitoFert Bor MAX 20 u drugom tretmanu repe je potrebno folijarno tretirati i sa preparatom FitoFert 4:10:40 +5MgO količinom 4 – 6 kg/ha.

# ULJANA REPIĆA

Glifomark ili Cosmic 36 (4,0-12,0 l/ha)

Force 1,5 G (5,0-7,0 kg/ha)  
Depozitorom pri setvi



## FITOFFERT - folijarna ishrana

Uljana repica je biljka sa visokim potrebama za Borom. Nedostatak bora može ozbiljno da ugrozi prinos uljane repice. Problem kod ovih useva predstavlja relativno brz rast tako da je repicu moguće tretirati u početnoj fazi nakon nicanja 3-4 lista. Tretman vršiti preparatom FitoFert Bor MAX 20, 1 kg/ha, samostalno ili u kombinaciji sa preparatom FitoFert Ultra 20:20:20 u količini 4-6 l/ha. Prisustvo dovoljnih količina bora u repici stimuliše: rast i grananje korenovog sistema, vegetativni rast, sazrevanje i grananje, cvetanje, oplodnju. Takođe utiče i na asimilaciju azota i sadržaj ulja.

# Uputstvo za pravilno korišćenje (rastvaranje) FitoFert đubriva

Vodotopiva FitoFert đubriva su 100% rastvorljiva u vodi, ako se pravilno koriste! Količina đubriva koja može da se rastvari, direktno zavisi od temperature i količine vode. Bez problema se rastvara 1 kg u 10 l vode, tj. 10% koncentracije, pri temperaturi od 20° C. Kod rastvaranja većih količina đubriva, nikako đubrivo ne sipati direktno u rezervoar prskalice, već to uraditi u nekoliko faza: 5 kg đubriva rastvoriti u 20 – 25 l vode, uz intenzivno mešanje od 3 – 5 minuta. Zatim prskalicu napuniti do polovine vodom i napravljeni predrastvor sipati u prskalicu i uključiti mešać na prskalici.

Zatim dodati pesticid, ako je predviđeno. Dopuniti rezerovar sa vodom do vrha. Ostaviti mešać na prskalici da radi par minuta. Ovim postupkom bilo bi završeno pravilno rastvaranje FitoFert đubriva. Ukupna koncentracija đubriva + pesticida ne bi trebalo da prelazi 2%, jer u protivnom mogu se pojaviti ožegotine! Kod primene u fertigaciji (sistemom kap po kap) koncentracija ne bi trebalo da prelazi 0.1%, što podrazumeva na 1000 l vode predviđene za zalivanje dodaje se 1 kg ili 1 l FitoFert đubriva. Izuzetak je formulacija 10:40:10 u početnim fazama gde se koristi 0.2%.



# Beleške

## **HERBICIDI**

ACETOHLOR 900  
 ACETOMARK  
 AGRAM  
 AKRIS  
 ARRAT  
 BENTAMARK  
 CALLISTO  
 CAMBIO  
 CASPER 55 WG  
 CLARO  
 CLIO  
 COSMIC 36  
 DEVRINOL 45 F  
 DIMARK  
 DUAL 960 EC  
 DUO SISTEM  
 FLUROMARK  
 FOCUS ULTRA  
 FRONTIER SUPER  
 GIRASOLIN  
 GLIFOMARK  
 KLETOX  
 MERLIN DUO  
 METMARK  
 MOTIVELL  
 MUSTANG  
 PEAK 75 WG  
 PIRALIS  
 PULSAR 40  
 REGLONE FORTE  
 RIMEX  
 RIMEX EXTRA  
 SIRAN  
 SYMPHONY  
 TARGA SUPER  
 TRIMARK



## **FUNGICIDI**

ACROBAT MZ WG  
 AGRODIN 60  
 BLUE BORDO  
 BRAVO 720 SC  
 CANTUS  
 CAPTAN WP 50  
 CAPTAN 80 WG  
 COLLIS  
 CUPRABLAU Z  
 CUPRABLAU Z ULTRA  
 DELAN 700 WG  
 DITHANE DG NEO TEC  
 DITHANE M 45  
 DITHANE M 70  
 FLINT PLUS  
 FOLIO GOLD 537,5  
 FORUM STAR  
 FOSTONIC 80 WP  
 FUNGURAN OH  
 FUNOMIL  
 INDAR 5 EW  
 KARATHANE  
 MICROTHIOL DISPERSS  
 PROPLANT 722  
 PYRUS 400 SC  
 REVUS  
 RIAS 300 EC  
 RIDOMIL COMBI 45 WG  
 RIDOMIL GOLD MZ 68 WG  
 SCORE 250  
 SHIRLAN 500 SC  
 SIGNUM  
 STROBY WG  
 SWITCH 62,5 WG  
 SYLLIT 400 SC  
 SYSTHANE 12 E  
 TERCEL  
 TILT 250  
 TOPAS 250 EC

## **INSEKTICIDI**

ACTARA 25 WG  
 ACTELLIC  
 AFINEX 20 SP  
 CHESS  
 CYTHRIN 250 EC  
 DEMITAN 200 SC  
 FORCE 0,5 G  
 FORCE 1,5 G  
 ICON 10 WP  
 ICON 10 CS  
 INSEGAR 25 WG  
 MATCH 050 EC  
 NURELLE D  
 SANMITE 20 WP  
 VANTEX 60 CS

## **SREDSTVA ZA TRETIRANJE SEMENA**

APRON  
 CRUISER 350 FS  
 FORCE ZEA  
 MAXIM XL 035  
 SEMAFOR  
 REGULATORI RASTA  
 NEO STOP  
 REGALIS

## **STIMULATORI OPLODNJE**

BM 86  
**RODENTICIDI**  
 GARDENTOP  
**LIMACIDI**  
 GARDENE

# Agrosvet